


โรคติดเชื้อไวรัสซิกา

ภัยเงียบจาก ยุงลาย

“โรคติดเชื้อไวรัสซิกา หรือ โรคไข้ซิกา” เกิดจากการติดเชื้อไวรัสซิกา อยู่ในตระกูลฟลาวิไวรัส (flavivirus) มีลักษณะคล้ายคลึงกับ ไวรัสไข้เหลือง, ไวรัสแดงกึ่ง, ไวรัสเวสต์ไนล์ และไวรัสไข้สมองอักเสบเจอี มียุงลายเป็นพาหะนำโรค โรคนี้ส่วนใหญ่ป่วยแล้วหายได้เอง อาการโรคไม่รุนแรง มีปัญหาเฉพาะกับหญิงตั้งครรภ์




อาการ



มีไข้



ปวดศีรษะ



ตาแดง



มีผื่นแดง



ปวดข้อ
ปวดกล้ามเนื้อ



หากได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง อาการเหล่านี้จะทุเลาลงภายในเวลา 2 - 7 วัน



ปกติ



ผิดปกติ

การติดเชื้อในสตรีมีครรภ์ อาจทำให้เกิดภาวะศีรษะเล็กในเด็กแรกเกิด (Microcephaly)

การรักษา

ส่วนใหญ่มีอาการไม่รุนแรง สามารถรักษาได้โดย...



1 พักผ่อนให้เพียงพอ

2 ดื่มน้ำมาก ๆ



3 หากมีไข้ให้กินยาพาราเซตามอล
ห้ามกินแอสไพริน



การป้องกัน

1



เก็บบ้าน ให้สะอาดปลอดโปร่ง

2



เก็บขยะ คัดแยกขยะ และทิ้งให้เรียบร้อย

3



เก็บน้ำ ปิดฝาภาชนะให้สนิท หรือเทน้ำทิ้ง เพื่อไม่ให้ยุงลายวางไข่และอาศัยอยู่ในบ้าน

➤ หากอาการไม่ดีขึ้นควรรีบไปพบแพทย์ <

ขอขอบคุณข้อมูลจาก กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
กองสาธารณสุขท้องถิ่น : กลุ่มงานป้องกันโรค